



2017 년 7 월 21 일

안녕하십니까, 고객 여러분!

최근 식품의약품안전처(이하 식약처)는 '의약외품 모기·진드기 등 기피제(7성분)에 대한 안전성·유효성 재평가'를 실시하고, 관련업체에 제품 표기에 대한 변경사항을 공고했습니다.

저희 헨켈홈케어코리아도 식약처의 공고사항을 소비자에게 전달하고자 아래와 같이 제품 표기에 대한 변경사항을 알려드리니, 고객님들께서는 제품사용 시 정확하게 숙지해주시길 바랍니다.

현재 매장에서 판매중인 제품과 사용중인 제품은 이번 공고와 관련 없이 사용할 수 있으며, 변경사항은 2017 년 7 월 30 일 이후 출고되는 제품부터 적용됩니다.

언제나 고객의 안전을 최우선으로 생각하는 헨켈홈케어코리아는 앞으로도 업계 선도 기업으로써 타의 모범이 되도록 더욱 노력하겠습니다.

감사합니다.

헨켈홈케어 코리아 대표이사 김천수

-----아 래-----

[공고명]

식품의약품안전처 공고 제 2017 - 250 호 (2017.6.30 일자) 의약외품 재평가 결과에 따른 허가 사항 통일 조정에 따라 기피제 재평가 대상 품목의 제품 표기 변경사항

[해당제품]

- 홈키파 마이키파 퓨어미스트 (디에틸톨루아미드)
- 홈키파 마이키파 에스에어줄 (디에틸톨루아미드)
- 홈키파 마이키파 롤온 (이카리딘)
- 홈키파 마이키파 겔 (이카리딘)

[변경사항]

- 제품별 효능효과, 용법·용량, 사용상의주의사항

\*\*자세한 내용은 첨부된 파일을 참조하시길 바랍니다.

● 기피제 제품 표기 변경사항

[홈키파 마이키파 퓨어미스트 (디에틸톨루아미드)]

효능·효과	(분무형 액체) 모기, 진드기(작은소참진드기포함)의 기피
용법·용량	<p>- 만 12 세 이상~성인 : 약 10~20cm 의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 떨어져 바른다.</p> <p>- 만 2 세 이상~만 12 세 미만 : 1 일 1~3 회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.</p> <p>- 6 개월 이상~만 2 세 미만 : 1 일 1 회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. (단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용)</p> <p>- 6 개월 미만 : 사용하지 않는다.</p> <p>※ 소아(만 12 세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.</p>
사용 상의 주의 사항	<ol style="list-style-type: none"> <li>본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것</li> <li>진드기(작은소참 및 털) 기피 효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오.</li> <li>다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 : 6 개월 미만의 영아</li> <li>다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것             <ol style="list-style-type: none"> <li>피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것</li> <li>눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20 분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5 분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것 (눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음).</li> <li>삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨).</li> </ol> </li> <li>기타 이 제품의 사용 시 주의사항             <ol style="list-style-type: none"> <li>이 제품은 외용으로만 사용한다.</li> <li>신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.</li> <li>노출부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽</li> </ol> </li> </ol>

	<p>팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다.</p> <p>4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다.</p> <p>5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다.</p> <p>6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 떨어지지 말고 어른 손에 떨어져 발라준다.</p> <p>7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5 시간의 기피효과가 있으므로 4 시간 이내에서는 추가로 사용하지 말 것).</p> <p>8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다.</p> <p>9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다.</p> <p>10) 속옷에는 사용하지 않는다.</p> <p>11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.</p> <p>12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판덱스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스칠한 표면에 손상을 줄 수 있다.</p> <p>13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다.</p> <p>14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다.</p> <p>15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것</p> <p>16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것</p> <p>17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것</p> <p>6. 저장상의 주의사항</p> <p>1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것.</p> <p>2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.</p> <p>3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.</p>
--	---

**[홈키파 마이키파 에스에어졸 (디에틸톨루아미드)]**

효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기(작은소참진드기포함)의 기피
용법·용량	만 12 세 이상~성인 : 약 10~20cm 의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용 상의 주의 사항	<p>1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것</p> <p>2. 진드기(작은소참 및 털) 기피 효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오.</p>

	<p>3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 : 만 12 세 미만의 소아</p> <p>4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것</p> <p>1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것</p> <p>2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20 분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5 분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것 (눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음)</p> <p>3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨).</p> <p>5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항</p> <p>1) 이 제품은 외용으로만 사용한다.</p> <p>2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.</p> <p>3) 노출부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다.</p> <p>4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다.</p> <p>5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다.</p> <p>6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 떨어주지 말고 어른 손에 떨어져 발라준다.</p> <p>7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5 시간의 기피효과가 있으므로 4 시간 이내에서는 추가로 사용하지 말 것).</p> <p>8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다.</p> <p>9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다.</p> <p>10) 속옷에는 사용하지 않는다.</p> <p>11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.</p> <p>12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판덱스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스칠한 표면에 손상을 줄 수 있다.</p> <p>13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다.</p> <p>14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다.</p> <p>&lt;고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것&gt;</p> <p>(1) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것</p> <p>(2) 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것</p>
--	---

	<p>(3) 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것</p> <p>(4) 온도 40°C 이상의 장소에 보관하지 말 것</p> <p>(5) 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것</p> <p>(6) 불 속에 버리지 말 것</p> <p>(7) 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것</p> <p>(8) 밀폐된 장소에 보관하지 말 것</p> <p>6. 저장상의 주의사항</p> <p>1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것.</p> <p>2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.</p> <p>3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.</p>
--	---

[홈키파 마이키파 롤온(이카리딘)]

효능·효과	(액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	적당량을 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출 부위 및 신발, 양말, 의복 등에 바른다.
사용 상의 주의 사항	<p>1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것</p> <p>2. 털진드기 기피 효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오.</p> <p>3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 : 6개월 미만의 영아</p> <p>4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것</p> <p>1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것</p> <p>2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20 분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5 분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것 (눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음).</p> <p>3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨).</p> <p>5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항</p> <p>1) 이 제품은 외용으로만 사용한다.</p> <p>2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.</p> <p>3) 노출부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략</p>

	<p>양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다.</p> <p>4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다.</p> <p>5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다.</p> <p>6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5 시간의 기피효과가 있으므로 4 시간 이내에서는 추가로 사용하지 말 것).</p> <p>7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다.</p> <p>8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다.</p> <p>9) 속옷에는 사용하지 않는다.</p> <p>10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.</p> <p>11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판덱스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스칠한 표면에 손상을 줄 수 있다.</p> <p>12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다.</p> <p>13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다.</p> <p>6. 저장상의 주의사항</p> <p>1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것.</p> <p>2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.</p> <p>3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.</p>
--	---

### [홈키파 마이키파 겔(이카리딘)]

효능·효과	(겔제) 모기의 기피
용법·용량	적당량을 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출 부위 및 신발, 양말, 의복 등에 바른다.
사용 상의 주의 사항	<p>1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것</p> <p>2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 : 6개월 미만의 영아</p> <p>3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것</p> <p>1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것</p> <p>2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20 분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5 분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을</p>

	<p>받을 것 (눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음).</p> <p>3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨).</p> <p>5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 이 제품은 외용으로만 사용한다.</li> <li>2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.</li> <li>3) 노출부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다.</li> <li>4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다.</li> <li>5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다.</li> <li>6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5 시간의 기피효과가 있으므로 4 시간 이내에서는 추가로 사용하지 말 것).</li> <li>7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다.</li> <li>8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다.</li> <li>9) 속옷에는 사용하지 않는다.</li> <li>10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.</li> <li>11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판덱스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스칠한 표면에 손상을 줄 수 있다.</li> <li>12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다.</li> <li>13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다.</li> </ol> <p>6. 저장상의 주의사항</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것.</li> <li>2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.</li> <li>3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.</li> </ol>
--	--